

Brustvergrößerung (Augmentation)

Zur Brustvergrößerung werden in aller Regel Implantate eingesetzt. Trotz vieler Diskussionen in der Vergangenheit sind Silikon-Gel-Implantate immer noch der Standard und für die meisten Anwendungen die beste und sicherste Lösung.

Je nach körperlichen Voraussetzungen und gewünschtem Ergebnis, können verschiedene technische Variationen angewendet werden.

Dies betrifft einerseits die Position des Implantates (unter der Brustmuskulatur oder darüber), den Zugang (durch die Achselhöhle, durch die Brustwarze, über einen Schnitt am Rand der Areola, oder von der Unterbrustfalte aus), aber auch die Form und den genauen Typ des Implantates (hohes oder niedriges Profil, symmetrisch oder tropfenförmig, etc.)

In der Regel wird bei uns die Operation ambulant in Narkose durchgeführt. Nach dem Eingriff ist es notwendig für ca. 4 Wochen einen speziellen BH mit einem Band über der Brust zu tragen.

Eine Pauschallösung, die für alle Situationen gleichermaßen passt gibt es nicht, daher ist ein ausführliches Gespräch und eine entsprechende Untersuchung durch den Plastischen Chirurgen, der dann auch den Eingriff selbst durchführt, vor der Planung einer derartigen Operation zwingend notwendig.